

El tratamiento percutáneo del hallux valgus con la técnica de Reverdin - Isham.

Sánchez Pulgar, Juan Antonio (2005) *El tratamiento percutáneo del hallux valgus con la técnica de Reverdin - Isham*. Universidad Católica de Córdoba. [Tesis Doctoral].

El texto completo no está disponible en este repositorio.

Resumen

La cirugía percutánea mínimamente invasiva o MIS (del inglés minimal invasive surgery), ha hecho evolucionar en los últimos años el abordaje quirúrgico de toda una serie de patologías manifiestas en el antepié que afecta al 70 de la población a lo largo de la vida, con especial incidencia en mujeres. Fue el Dr. Stephen Isham, Director de esta Tesis, quien en la década del 80 describe una técnica personal modificando la original de Reverdin, con abordaje mínimamente invasivo. Esta técnica, que aún está en pleno desarrollo en nuestro país, representa una nueva filosofía que permite al cirujano intervenir simultáneamente varias patologías del antepié mediante mínimas incisiones asistidas por instrumental específico. En el Servicio de Traumatología y Ortopedia de la Clínica Universitaria Reina Fabiola - Fundación para el Progreso de la Universidad Católica de Córdoba, hemos intervenido quirúrgicamente 1.167 casos (agosto 2005). Para esta tesis se analizaron 93 casos con más de dieciocho meses de control y que cumplían con los siguientes criterios de inclusión: sólo presentaban hallux valgus y el único gesto quirúrgico utilizado era la técnica de Reverdin-Isham en el primer radio, sin otra intervención asociada en los metatarsianos.

Tipología documental: Tesis doctorales (Doctoral)

Palabras clave: Medicina. Cirugía. Hallux valgus. Traumatología.

Descriptores: [R Medicina > R Medicina \(General\)](#)

Unidad Académica: [Universidad Católica de Córdoba > Facultad de Medicina](#)